



1001, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 420, Montréal QC, H3A 3C8, [info@habitationssansfumeqc.org](mailto:info@habitationssansfumeqc.org)

## La fumée tertiaire

Le concept de [fumée tertiaire](#) est relativement récent. La [fumée tertiaire](#) désigne les résidus de fumée secondaire du tabac qui restent après qu'une personne a cessé de fumer, qui tapissent des objets et qui peuvent être remis en circulation dans l'air, selon les contextes. Les substances chimiques contenues dans la fumée qui sont huileuses ou cireuses sont plus susceptibles de coller aux surfaces que d'être éliminées par la ventilation. Cela dit, il existe encore de nombreuses questions face à sa persistance et les risques qu'elle pose.

La fumée tertiaire qui persiste dans un environnement intérieur [dépend de nombreux facteurs](#) (nombre de cigarettes fumées, degré de ventilation, quantité de meubles et de tissus, degré d'absorption et de désorption des surfaces, etc.)

Selon le [Centre national de recherche en santé aux États-Unis](#), l'exposition se fait surtout par contact avec la peau, mais l'inhalation de poussières contaminées est aussi possible. « Quand une personne touche [une surface qui présente des résidus de fumée](#), ces résidus se retrouvent sur leurs mains et présentent des risques supplémentaires quand les personnes touchent leur visage ou leur bouche. »

Les études ont révélé que les taux d'exposition des enfants sont supérieurs à ceux des adultes et que les enfants y sont plus vulnérables.

Les scientifiques pensent que ces résidus de fumée tertiaire peuvent rester dans l'environnement pendant des semaines, des mois voire des années, sur les surfaces et dans la poussière où elles finissent par dégager des [gaz](#).

Aux États-Unis, le programme CEASE a développé une campagne de sensibilisation et des outils visant à sensibiliser et [informer](#) sur la fumée tertiaire.